

**В случае подозрения
на заболевание
крупного рогатого скота,
появления клинических
признаков заразного
узелкового дерматита
владельцы животных
обязаны НЕМЕДЛЕННО
информировать
государственную
ветеринарную
службу района.**



ПАМЯТКА

**о мерах по профилактике
заразного узелкового
дерматита
крупного рогатого скота**

Заразный узелковый дерматит крупного рогатого скота – вирусное заболевание, характеризующееся лихорадкой, образованием кожных узлов (бугров), поражением глаз, слизистой оболочки дыхательного и пищеварительного трактов.

Человек не болеет.

Заразный узелковый дерматит наносит значительный экономический ущерб, так как вызывает снижение удоя молока, воспроизводительной функции, аборт и бесплодие, повреждение шкуры, а также гибель животных от секундарных инфекций. Летальность при заболевании может достигать 10%.

Заразный узелковый дерматит относится к карантинным заболеваниям и при его возникновении устанавливаются ограничительные (карантинные) мероприятия.

Средств специфической терапии при заражном узелковом дерматите не существует. Для предотвращения осложнений при лечении применяется антибиотикотерапия и химиотерапия.

Выздоровление происходит в 90% случаев при проведении своевременного лечения.

Пути передачи - трансмиссивно кровососущими насекомыми, комарами, мухами. В окружающую среду попадает с отторгаемыми кусочками пораженной кожи, молоком, спермой, слюной и кровью.

Обязательным условием профилактики является борьба с переносчиками заболевания – кровососущими насекомыми. **Необходима регулярная обработка (купка) животных** против кровососущих паразитов (клещей, слепней, комаров, оводов и др.)

Клинические признаки.

Болезнь протекает остро и хронически. Поражает животных обоего пола и всех возрастов.

Инкубационный период чаще 7-10 дней.

При острой форме повышение температуры до 40 °С. Снижение аппетита, слезотечение, серозно-слизистые выделения из носа.

Подлопаточные и предбедренные лимфатические узлы увеличены и легко прощупываются.

Через 48 часов на коже шеи, груди, живота, паха, головы, вымени образуются плотные узелки, с плотной поверхностью диаметром 0,5 - 7 см. Количество поражений варьируется от нескольких при легкой форме заболевания, до многочисленных поражений при тяжелой форме заболевания.

Резкое падение надоя молока. Молоко становится розоватым, густым, сдается болезненно по каплям, а при нагревании образует желеобразную массу.

Меры профилактики.

Эффективной мерой профилактики является вакцинация крупного рогатого скота против **заразного узелкового дерматита**.

Для профилактики и недопущения данного заболевания все граждане, имеющие на своих подворьях сельскохозяйственных животных, должны оставаться предельно бдительными и выполнять следующие правила:

- не допускать ввоз животных неизвестного происхождения, без соответствующих документов;
- извещать органы государственной ветеринарной службы о вновь приобретенных животных, полученном приплоде, об убое и продаже;
- представлять ветеринарным специалистам по их требованию животных для осуществления диагностических исследований и проведения вакцинации;
- проводить обработки крупного рогатого скота репеллентами в течение всего летне-пастбищного периода.

Схематическое изображение распространения ВЗУД

